



Secaar

Agir ensemble pour un développement intégral

Diffusé par **SECAAR**
01 BP 3011 LOMÉ 01 TOGO
00228 22 20 28 20
secretariat@secaar.org
www.secaar.org



LES PRATIQUES CULTURALES

MAIS - SORGHO - COTON - ARACHIDE - SOJA

Source : Ferme Baraka de Monkara, BP 36 - KOUMRA - TCHAD -

	MAIS	SORGHO	COTON	ARACHIDE	SOJA
SEMIS	15 à 25 kg / ha. 80cm entre les lignes et 20cm sur la ligne. 1 grain / poquet.	5 à 10 kg / ha. 80 cm entre les lignes et 40 cm sur la ligne. 4 grains / poquet.	30 kg / ha. 90 cm entre les lignes et 20 cm sur la ligne. 5 graines / poquet. Resemer 10jours après la levée ; après c'est inutile.	40 à 50 kg / ha. 60 cm entre les lignes et 15 cm sur la ligne. 1 graine par poquet.	60 kg / ha. 60 cm entre les lignes et 20 cm sur la ligne. 2 à 3 grains / poquet. Semer plus tard pour que la récolte se fasse après les pluies.
SOINS	1er sarclage : 1 semaine après la levée. 2ème : 15 jours après. 3ème = buttage 15 jours après.	1er sarclage en même temps que le démariage (laisser 1 ou 2 pieds / poquet) 8 à 10 jours après la levée. 2ème : 2 ou 3 semaines après. 3ème = buttage 2 ou 3 semaines après.	1er sarclage et démariage 10 à 20 jours après la levée (laisser 2 plants / poquet. 2ème : 2 à 3 semaines après. Buttage vers la 6ème à la 9ème semaine, directement après épandage de l'urée	1er sarclage 15 jours après le semis. 2ème à la floraison. Après 60jours, ne plus biner mais arracher les mauvaises herbes.	1ersarclage une semaine après le semis. 2ème quand les plantes ont 30 cm de hauteur. 3ème à la floraison
FUMURE	Le maïs est la culture qui répond le mieux à la fumure. Besoins / ha : 105 kg N, 50 kg P, 75 kg K. Cela correspond à 25 tonnes de fumier / ha. Pour augmenterencore le rendement, ajouter de l'urée avant la montaison.	Besoins : ha : 50 kg de N, 36 kg de P, 40 kg de K, soit l'équivalent de 15 tonnes de fumier / ha. On peut ajouter de l'urée au début de la montaison (30 à 50 jours après la levée	Les besoins du coton sont : 70 kg N, 22 kg P, 65 kg K, soit l'équivalent de 14 tonnes de fumier / ha. Le fumier oul'engrais complet doit être épandu avant ou au début de la culture. On apporte le complément d'azote par l'urée au moment du buttage (100 kg / ha).	Les besoins del'arachide sont : 45 kg N, 3 kg P, 12 kg K. L'arachide peut trouver elle-même l'azote dont elle a besoin dans l'air. Ses besoins en P et K sont faibles : elle n'a donc pas besoin de fumure. L'azote que l'on ajouterait pourrait même avoir un effet négatif sur les gousses puisqu'il fait pousser trop de feuilles.	Le soja étant une légumineuse, il n'a pas besoin qu'on lui apporte de l'azote. Ses besoins sont : 60 kg P et 75 kg K / ha. Ce sont des besoins importants que l'on peut couvrir avec des engrais P et K.

	MAIS	SORGHO	COTON	ARACHIDE	SOJA
ROTATION	On cultive le maïs après une légumineuse, éventuellement après le mil ou le coton.	On cultive le sorgho après une légumineuse ou du coton, éventuellement une jachère courte ou du mil.	Il faut cultiver le coton après une légumineuse plutôt qu'après une céréale.	Pas d'exigences particulières	On peut cultiver le soja après une céréale ou éventuellement l'arachide mais pas après une jachère.
REMARQUES	Le maïs est sensible au striga et à la sécheresse.	Le sorgho est sensible au striga. Il ne faut pas cultiver sorgho sursorgho ni le mettre après une jachère de longue durée.	Pour les traitements, ne le faire que si c'est nécessaire. Observer si le champ est infesté.	Attention à ne pas récolter trop tard et à ne pas laisser la récolte trop longtemps sur le sol.	Récolter rapidement pour éviter que les gousses ne s'ouvrent. Couper les tiges pour laisser les racines sur le sol.

Remarques valables pour toutes les cultures :

- Le hersage améliore aussi la levée, mais il faut l'éviter si on a épandu du fumier car il pourrait remonter.
- Le buttage est bon pour toutes les cultures, sauf pour l'arachide.
- Le labour en fin de saison de culture est toujours une bonne opération car il permet d'enfouir les restes des cultures et des herbes qui enrichissent le sol en matière organique.